




PICC

CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA

POSICIONAMENTO DO CATETER

O PICC é um cateter central que possibilita administração de TODAS as medicações (drogas vasoativas, quimioterápicos, NPT) devido ao posicionamento da ponta distal, em 3º espaço intercostal posterior.

A transfusão de hemocomponentes acontece de forma eficaz e segura.

A administração de contraste por bomba injetora é possível, pois o cateter suporta até 300 psi (optar pela via roxa).

A durabilidade do cateter é indefinida, não havendo prazo para retirada do mesmo.

Há vários casos, nesta Instituição, de pacientes que permaneceram com o PICC por 180 dias.

INDICAÇÕES E CRITÉRIOS PARA USO DO PICC

- Duração da terapia endovenosa (período maior que 7 dias)
- Medicações com características vesicantes / irritantes (Ex: drogas vasoativas, Nutrição Parenteral Total, quimioterápicos ou alteração significativa do pH)
- Características vasculares do paciente (veias periféricas exauridas)
- Idade do paciente, comorbidade, história de infusão

COLETA DE SANGUE PELO PICC

A ANVISA não recomenda a coleta de sangue pelo PICC, devido ao risco de infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter.

Porém, em casos de exceções (pacientes difíceis de coleta em outros sítios), realizar a coleta e lavar cada via do cateter com 30 ml de SF 0,9%, com seringa de 10 ml e técnica de turbilhonamento.

